

# BECUE


LOGOPEDIE

Logopedie Laurence Becue

Georges Martensstraat 9 bus 3, 9800 Deinze

0478 311 591

laurencebecue@hotmail.com





## AFWIJKENDE MONDGEWOONTEN

Afwijkende mondgewoonten kunnen een negatieve invloed hebben op de tandstand, articulatie en algemene gezondheid. Een logopedische behandeling kan het afwijkend mondgedrag modificeren en de mondmotoriek optimaliseren. Concreet kan de logopedist ondersteuning bieden bij het afleren van duimzuigen, de lip- en tongspieren versterken, een correcte slikact aanleren en articulatietherapie geven. Hierbij zijn een gemotiveerde patiënt en ouders essentieel. Verder is ook een goede samenwerking tussen orthodontist en logopedist van groot belang om de behandeling met succes te laten verlopen.

## DUIM, VINGER- EN/ OF SPEENZUIGEN

Zuiggewoonten kunnen erg hardnekkige gewoonten zijn. Dit kan een negatieve invloed hebben op de tandenstand, articulatie en spierkracht in en rond de mond. Door het zuiggedrag komt het regelmatig voor dat de spieren in en rond de mond verslappen, waardoor habitueel mondademen, open mondgedrag en een afwijkend slikpatroon kan ontstaan.

---

## OPEN MONDGEDRAG

Normaliter dient de mond gesloten te zijn, rust het tongpunt tegen het gehemelte achter de boven-tanden en wordt er door de neus geademd. Als de mond in rust open is, is er sprake van open mondgedrag. De tong ligt dan slap op de mondbodem en drukt met grote kracht tegen de tanden.

---

## HABITUEEL MONDADEMEN

Bij habitueel mondademen is de gewoonte ontstaan om door de mond te ademen terwijl de neus voldoende doorgankelijk is. Dit kan invloed hebben op de tandenstand, lichaamshouding, gehoor en stem.

---

## AFWIJKENDE TONGHOUDING IN RUST

Normaliter zit de tong achter de boventanden tegen het gehemelte. Bij een afwijkende tongpositie in rust ligt de tong vaak op de mondbodem, tegen of tussen de tanden. Dit kan de tandenstand, vorm van het gezicht en de articulatie negatief beïnvloeden.

---

## FOUTIEVE LIPGEWOONTEN

Dit kan liplikken of lipzuigen zijn. Deze gewoonten komen veelal voor bij mensen die door de mond ademen. Ze trachten de droge lippen te bevochtigen met de tong.

---

## NAGELBIJTEN

Tijdens het nagelbijten schuift de onderkaak naar voren en ontstaan er spanning in de kaakgewrichten. Daarnaast kan dit ook ontstekingen van het weefsel rond de nagels veroorzaken. Tot slot gaat de tong ook op zoek naar de plek waar de nagel in de mond komt, wat opnieuw druk veroorzaakt en afwijkingen in de tandenstand kan teweegbrengen.

---

## AFWIJKEND SLIKKEN

Men spreekt van een afwijkend slikpatroon wanneer de tong- en/of lippositie afwijkend is tijdens het slikken. In 24 uur slikt men gemiddeld 2000 keer. Wanneer de tong of lippen dan niet correct worden geplaatst, kan dit het evenwicht opnieuw verstoren wat een negatieve invloed kan hebben op de tandenstand.

---

## ARTICULATIESTOORNISSEN

Een articulatiestoornis kan het gevolg zijn van een structurele afwijking aan het gebit. Echter kunnen bovenstaande problemen eveneens een invloed hebben op de articulatie. Een afwijkende tongpositie in rust kan zorgen voor een foutieve articulatiebasis. Dit resulteert in een articulatiestoornis van voornamelijk de spraakklanken die gevormd worden met de tong tegen het gehemelte zoals de /s/, /n/, /l/, /t/ en /d/.

